



Sehr geehrte Patientin,

Wir versprechen Ihnen, dass wir Sie ernsthaft, umfassend und ehrlich beraten und Ihnen keine Operation „verkaufen“ wollen. Wir werden nur die Operationen durchführen, die wir „beherrschen“ und minimieren das Risiko Ihres Eingriffs damit erheblich. Wir lassen uns Zeit bei der Beratung, drängen Sie nicht zu einem Eingriff und lassen Sie auch nach der Operation nicht alleine.

**Vergleichen Sie nicht den Preis, vergleichen Sie die Leistung.**

Eine Schamlippenverkleinerung, wohl die meist nachgefragte Intimkorrektur, wird aufgrund von Beschwerden oder aus ästhetischen Gründen gewünscht.

Immer mehr Frauen empfinden es als unschön, wenn die inneren Labien größer als die äußeren sind. Meist handelt es sich dabei um eine angeborene vergrößerte Anlage der Labien / Labienhyperplasie. Auch nach Schwangerschaften oder im Alter können sich Labien entsprechend entwickeln. Die äußeren Schamlippen erschlaffen im Verlauf des Lebens.

Die Größe der äußeren, großen Schamlippen ist individuell unterschiedlich. Das Volumen der äußeren Schamlippen nimmt dabei mit dem Alter ab, während die inneren Schamlippen während der Geschlechtsreife der Frau noch wachsen. Durch den Trend der Intimrasur wird das Schrumpfen der großen Schamlippen bzw. das Größenmissverhältnis zu den inneren Schamlippen erst sichtbar. Bei einer Schamlippenverkleinerung wird der Hautüberschuss, die überschüssige Schleimhaut entfernt. Da diese Schleimhaut sehr gut durchblutet ist, muss eine sorgfältige Blutstillung erfolgen. Die Wunden werden schließlich mit einem selbstauflösenden Faden vernäht.

Nach der Abheilung ist die Narbe fast oder gar nicht mehr sichtbar, da Schleimhautgewebe eine außerordentliche Regenerationsfähigkeit besitzt.

Eine Schamlippenverkleinerung wird meist in örtlicher Betäubung und ambulant durchgeführt. Nach unseren Erfahrungen empfiehlt sich aber ein zusätzlicher Dämmerschlaf.



**Dr. med. J. Henscheid**  
ÄSTHETISCH PLASTISCHE CHIRURGIE

Verkleinert man die großen / äußeren Schamlippen ist die Vorgehensweise grundsätzlich gleich. Die Schnittführung wird dann natürlich so gewählt, dass die Narbe zwischen den äußeren und inneren Schamlippen liegt und so nicht mehr sichtbar ist.

Die Schwellung nach der Schamlippenverkleinerung kann erheblich sein. Wir empfehlen wie bei den meisten Eingriffen in der Ästhetischen Chirurgie die Einnahme von Arnika 14 Tage vor und nach der Operation.

Die Kosten für eine Schamlippenverkleinerung liegen mit ungefähr €1.000,- verhältnismäßig günstig. Zusätzliche Kosten für die Anästhesie sollten Sie einplanen.

Schönheit ist bezahlbar, selbstverständlich können Sie sich Ihren Wunsch auch mit Hilfe einer Finanzierung erfüllen. Wir bieten Ihnen über unsere Hausbank günstige Konditionen, variable Laufzeiten, so dass Sie immer flexibel bleiben und absolute Diskretion bei der Realisierung Ihrer Operation.

Eine genaue, Ihren individuellen Vorstellungen entsprechende Beratung kann nur durch ein persönliches Arztgespräch erfolgen.

Vereinbaren Sie Ihren Termin!

**Tel.: 0211 – 69 90 90**

Mit freundlichen Grüßen

**Dr. med Jutta Henscheid**

**Ästhetische Chirurgie**

Praxis Dr. med. Jutta Henscheid  
Am Seestern 4 • 40547 Düsseldorf  
Tel.: 0211 - 69 90 90 • Fax: 0211 - 69 90 990  
info@dr-henscheid.de  
www.dr-henscheid.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank  
IBAN: DE48 3007 0024 0023 6992 00  
BIC: DEUTDE3333  
Ust-IdNr.: DE 228 561 660